

ЭСПАКТИВ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Эспактив.

Международное непатентованное название:

Уголь активированный + Симетикон.

Лекарственная форма: твердые желатиновые капсулы для приема внутрь.

Состав: каждая твердая желатиновая капсула содержит:

Активированный уголь ВР 250 мг;

Симетикон USP 80 мг.

Фармакотерапевтическая группа: пеногасящие ветрогонные препараты.

Код АТХ: А07ВА51.

Фармакологические действия:

Фармакодинамика:

Симетикон — пеногасящее, ветрогонное средство.

Обладает поверхностно-активными свойствами, проявляя способность пеногасителя: снижает поверхностное натяжение пузырьков газа (пеногасящая активность) в пищеварительном тракте, приводя к их разрыву; высвобождающиеся при распаде пузырьков газы поглощаются стенками кишечника или выводятся благодаря перистальтике, уменьшает содержание газов в кишечнике.

При контрастировании ЖКТ обеспечивает равномерное орошение слизистых оболочек контрастным средством, препятствует разрыву контрастной пленки, предупреждает помехи и перекривия изображений.

Активированный уголь — дезинтоксикационное, адсорбирующее, антидиарейное средство. Характеризуется большой поверхностной активностью, обуславливающей способность связывать вещества, понижающие поверхностную энергию (не изменяя их химическую природу). Сорбирует газы, токсины, алкалоиды, гликозиды, соли тяжелых металлов, салицилаты, барбитураты и другие соединения, уменьшает их всасывание в ЖКТ и способствует выведению их организма с фекалиями.

Активен, как сорбент, при гемоперфузии. Слабо адсорбирует кислоты и щелочи (в т.ч. соли железа, цианиды, малатион, метанол, этиленгликоль). Не раздражает слизистые оболочки.

Фармакокинетика:

Симетикон - химически инертен, не всасывается из ЖКТ, экскретируется в неизменном виде.

Уголь активированный - не токсичен, хорошо выводится из организма, не всасывается из кишечника и полностью выводится с каловыми массами через 7-10 часов.

Показания к применению:

- симптомы метеоризма: вздутие живота, чувство распирания и переполнения в подложечной области, усиленное газообразование (в т.ч. в послеоперационном периоде);
- аэрофагия;
- диспепсия;
- синдром Рэмхельда;
- подготовка к диагностическим обследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, рентгенография и др.), в т.ч. в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения методом двойного контрастирования;
- отравления тензидами (в т.ч. поверхностно-активными веществами, входящими в состав моющих средств) в качестве пеногасителя.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- кишечная непроходимость;

- обструктивные состояния ЖКТ;

- детский возраст до 6 лет.

- применение препарата при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует назначать препарат при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Назначают взрослым и детям старше 6 лет по 2

капсулы - 2-3 раза в сутки.

Капсулы принимают внутрь (с небольшим количеством жидкости) после приема пищи и перед сном.

Для подготовки к исследованиям назначают по 2

капсулы - 3 раза/сутки за день до исследования и 2

капсулы утром в день обследования.

Побочные действия:

- запор;
- диарея;
- временное потемнение стула, рвота;
- аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Активированный уголь - снижает всасывание и эффективность лекарственных препаратов, принимаемых внутрь одновременно с ним; уменьшает активность внутрижелудочных действующих веществ (например, ипекакуаны).

Симетикон - клинически значимого взаимодействия с другими ЛС не установлено.

Особые указания:

Активированный уголь может окрашивать каловые массы в чёрный цвет.

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, которые нуждаются в повышенном внимании.

Форма выпуска:

10 твердых желатиновых капсул в каждом алюминиевом блистере ПВХ. 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Ларк Лабораторис (И) Лтд.,
Индия