

ИБУЛАЙТ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Ибулайт.

Международное непатентованное название: Ибупрофен + Ментол + Метилсалицилат + Мефенезин.

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Состав:

Ибупрофен ВР 50 мг;
Ментол ВР 5 мг;
Метилсалицилат ВР 5 мг;
Мефенезин 50 мг;
Гелевая основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) - производные пропионовой кислоты.

Код АТХ: M02AA.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Ибулайт гель - комбинированный препарат для наружного применения. Фармакологическое действие препарата обусловлено составом входящих в него компонентов.

Ибупрофен - относится к НПВП. Оказывает местное обезболивающее и противовоспалительное действие. Механизм действия ибупрофена обусловлен торможением синтеза простагландинов - медиаторов боли и воспаления.

Метилсалицилат - обладает противовоспалительной и обезболивающей активностью.

Мефенезин - мышечный релаксант центрального действия для симптоматического лечения болезненных спазмов мышц опорно-двигательного аппарата.

Ментол - вызывает раздражение нервных окончаний, оказывает местное отвлекающее и легкое обезболивающее действие, вызывает местное ощущение охлаждения. При наружном применении оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, антиэкссудативное действие.

Фармакокинетика:

При местном применении ибупрофен и метилсалицилат быстро всасываются и проникают в подкожную клетчатку, мышечную ткань и суставную капсулу, уменьшают боль и воспаление в суставах, утреннюю скованность и припухлость суставов, способствуют увеличению объема движений. Концентрация активных веществ в синовиальной жидкости при этом составляет 1,45 мг/мл. Выводится преимущественно с мочой.

Показания к применению:

- заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, люмбаго, ишиас);
- ревматические заболевания мягких тканей (в т.ч. тендовагинит, бурсит, поражение периартикулярных тканей);
- посттравматическое воспаление мягких тканей и суставов (в т.ч. вследствие растяжений, перенапряжений и ушибов);
- боли в спине, пояснице.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к ибупрофену или другим компонентам препарата;
- бронхиальная астма, провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВС;
- нарушение целостности кожных покровов;
- беременность и период лактации;
- детский возраст до 14 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не рекомендуется.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

Взрослым и детям старше 14 лет небольшое количество геля наносится на 4 раз в сутки, тонким слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают. После применения Ибулайт геля следует вымыть руки, если они не являются объектом лечения. Продолжительность применения препарата без консультации врача - не более 10 дней.

Побочное действие:

Препарат может давать аллергические реакции в виде генерализованной кожной сыпи:

- крапивницы;
- ангионевротического отека;
- бронхоспастические реакции;
- фотосенсибилизацию;
- экзему;
- контактный дерматит (в т.ч. зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение).

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Ибулайт гель может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания:

Гель следует наносить на неповрежденную кожу, избегая попадания в глаза, на слизистые оболочки и открытые раневые поверхности. После нанесения не следует накладывать окклюзионную (воздухо-непроницаемую) повязку.

При длительном применении препарата в больших дозах появляется риск развития побочных эффектов.

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 30 г в алюминиевой тубе. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Зи Лабораторис Лтд.
Индия