

 PANTONE 179 C

 PANTONE 432 C

140x250 mm

ЛИНДАВИТ КАЛЬЦИЙ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Линдавит Кальций.

Международное непатентованное название: комбинированный препарат.

Лекарственная форма: шипучие таблетки, растворимые в воде.

Состав: каждая шипучая таблетка содержит:

Кальций (карбонат) 1000 мг;
Витамин D3 10 мкг (400МЕ);
Витамин B6 6 мг;
Витамин С 120 мг;
Витамин K1 60 мкг;
Магний (сульфат) 60 мг;
Инулин 100 мг.

Фармакотерапевтическая группа: препарат кальция в комбинации с витаминами и минералами.

Код АТХ: A12AX.

Фармакологическое действие:

Линдавит Кальций - комплекс витаминов и минералов, разработанный специально для устранения проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом.

Кальций в повышенной концентрации поддерживает метаболизм костной ткани.

Витамин D3 необходим для резорбции кальция в кишечнике и его последующего поглощения.

Витамин С необходим для формирования коллагена – важнейшего белка костной ткани.

Витамин K1 участвует в синтезе костного белка – остеокальцина.

Магний способствует всасыванию кальция и витамина С, а также предотвращает кальцификацию мягких тканей.

Инулин способствует поглощению кальция, восстановлению кишечной микрофлоры и снижает риск запоров, связанных с приемом препаратов кальция.

Показания к применению:

- лечение и профилактика остеопороза;
- лечение и профилактика постклимактерических изменений костной ткани;
- лечение и профилактика дефицита Ca2+ и витамина D3;
- остеомалация (связанная с нарушением минерального обмена у больных старше 45 лет);
- гипокальциемия (в т.ч. после соблюдения диет с отказом от приема молока и молочных продуктов).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к составу препарата.

Беременность и период лактации:

Не рекомендуется принимать препарат беременным и кормящим женщинам.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь.

Взрослые и дети старше 18 лет: предварительно растворить 1 шипучую таблетку в стакане воды (200 мл).

Принимать по таблетке 1 раз в день во время еды.

Продолжительность приема - 20 дней.

Повторный прием 2-3 раза в год.

Побочные действия:

Появляются при приеме больших доз. При этом наблюдаются диспепсические расстройства (тошнота, рвота, понос). При применении в терапевтических дозах осложнения возникают крайне редко.

Передозировка:

При передозировке наблюдается усиление побочных эффектов.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами:

Нет данных.

Особые указания:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Препарат не может быть использован в качестве замены разнообразного питания.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска:

20 шипучих таблеток для приема внутрь в пластиковой тубе. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

24 месяца. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

 **Belinda**

Произведено для:

BELINDA Laboratories

Лондон, Великобритания

Производитель:

Kendy Ltd.

Баня, Болгария