

 PANTONE 179 C

 PANTONE 432 C

120x165 mm Front

БЕЛНЕФРОКС

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Белнефрокс.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав: каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

Порошок листьев розмарина (*Rosmarinus officinalis*) 18 мг

Экстракт корня любистока (*Levisticum officinale*) 18 мг

Экстракт золототысячника обыкновенного из цельного растения (*Centaurium erythraea*) 18 мг

Разрешенные консерванты и вспомогательные вещества q.s.

Фармакотерапевтическая группа: диуретическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: G04BX.

Фармакологическое действие:

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает мочегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие.

Порошок листьев розмарина (Rosmarinus officinalis) - помогает при заболеваниях мочеполовой сферы, обладая мочегонным свойством, выводя токсины и шлаки из организма. Розмарин доказал эффективность в отношении бактерии *Staphylococcus saprophyticus*, вызывающей цистит. Способен снижать рост целого ряда грамположительных патогенных бактерий. Содержащиеся в розмарине антиоксиданты (розмариновая кислота, фенольные дитерпены и др.) помогают снизить процессы окисления при воспалении и поддержать кровоснабжение почек, защищая от ишемической нефропатии.

Экстракт корня любистока (Levisticum officinale) - обладает антибактериальной активностью. Используется при инфекции мочевыводящих путей, содержащиеся в растении терпеновые производные вызывают усиленный диурез без потери электролитов. Также корни любистока используют для профилактики мочекаменной болезни, для лечения цистита, для уменьшения отеков, как естественное мочегонное и тонизирующее средство.

Экстракт золототысячника обыкновенного (Centaurium erythraea) - способствует выведению излишков жидкости из организма без нарушения ионного баланса (калийсберегающий эффект).

Показания к применению:

В комплексной терапии при лечении:

- хронических инфекций мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит);
- нефункционных хронических воспалений почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит);
- в качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата во время беременности возможно только по назначению врача в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Неизвестно, выделяются ли активные компоненты препарата Белнефрокс или его метаболиты в материнское молоко. Нельзя исключить риск для ребенка на грудном вскармливании. Белнефрокс не следует принимать во время кормления грудью.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, не разжевывая, запивая водой.

Взрослым - по 2 таблетки 3 раза в сутки, детям школьного возраста - по 1 таблетке 3 раза в сутки. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2–4 недель.

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.

Побочные действия:

Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — тошнота, рвота, диарея.

Могут возникать аллергические реакции. Их частота неизвестна. При появлении первых признаков аллергической реакции или других нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Если у пациента отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или замечены любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Передозировка:

В настоящий момент данные о передозировке и интоксикации отсутствуют.

Лечение: в случае передозировки препарата назначают симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестно.

Особые указания:

При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано.

При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии.

В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией.

В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами:

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска:

60 таблеток, покрытых пленочной оболочкой в пластиковой бутылке вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:

BELINDA Laboratories LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

Сиддхаю Аюрведик Рисерч Фаундейшн Пвт. Лтд.,

Индия