

 PANTONE 179 C

 PANTONE 432 C

140x250mm

ЭКСТАЛОНГ

Инструкция по применению

Торговое название: Эксталонг.

Международное непатентованное название: лидокаин.

Форма выпуска: спрей для наружного применения.

Состав: каждый мл содержит:

Лидокаин ВР 100 мг

Этанол ВР 30,4% w/v

Ароматизированная основа q.s.

Фармакологическое действие:

Действующим веществом лидокаинового спрея для мужчин Эксталонг является лидокаин, снижающий чувствительность рецепторов головки полового члена. Благодаря этому мужчина дольше обычного для своей физиологии может оставаться в возбуждённом состоянии, что и продлевает половой акт. При этом препарат не влияет на яркость и остроту ощущений, возникающих в момент эякуляции.

Для удобства применения Эксталонг выполнен в виде спрея. Он легко и быстро наносится на головку полового члена. Форсунка равномерно распыляет препарат, что повышает его эффективность. Для нанесения средства достаточно лёгкого нажатия на кнопку крышки флакона.

Состав является слабым анестетиком с пролонгированным периодом действия. Лидокаин блокирует пути, по которым нервные импульсы от рецепторов головки полового члена передаются в кору головного мозга. Подавление эктопических зон возбуждения носит временный характер, поэтому половой акт всё же достигает физиологического окончания, но с задержкой.

Средство не оказывает влияния на проникающую способность сперматозоидов. Препарат абсолютно безопасен для детородной функции мужчины.

Показания к применению:

Использование средства рекомендуется при повышенной возбудимости, которая провоцирует ранее семяизвержение, назначается при комплексном устранении этой сексуальной патологии.

С помощью спрея повышается эффективность медикаментов, применяемых в процессе лечения ранней эякуляции для воздействия на центральную нервную систему.

Противопоказания:

Препарат Эксталонг противопоказан мужчинам и их партнерам с аллергической реакцией на лидокаин; нарушения кожного покрова, например, язвы, трещинки и так далее.

Не рекомендуется применять состав лицам с сердечно-сосудистыми проблемами и отклонениями в здоровье печени.

Способ применения и дозы:

Для обеспечения эффективности препарата его нужно наносить на головку полового члена примерно за 15-20 минут до полового акта. Форсунка формирует микроскопические капли, которые равномерно распределяются по коже и создают слой анестетика, который начинает незамедлительно воздействовать на рецепторы. По окончании полового акта специально удалять препарат с кожи не требуется.

Рекомендуемое расстояние от распылителя до кожи составляет 10 см. Нажимая на кнопку, расположенную на крышке флакона, разбрызгивайте средство по коже. Одноразовая доза составляет от 3 до 5 распылений.

Побочные действия:

Возможно кратковременное жжение в области головки полового члена. Неприятные ощущения могут длиться недолго и прекращаются по мере наступления анестезии. Данное побочное действие отмечается не у всех мужчин, а только у тех, чья кожа обладает повышенной чувствительностью.

Передозировка:

Повышенная дозировка может вызывать учащение сердцебиения и другие неприятные симптомы.

Особые указания:

Для выявления аллергических реакций рекомендуется сначала нанести небольшое количество спрея на запястье.

Форма выпуска:

Спрей для местного применения 50 мл во флаконе. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:

BELINDA Laboratories

Лондон, Великобритания

Производитель:

Биодил Фармасьютикалс Pvt. Лтд.

Индия