

ИММУБЕЛС

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Иммубелс.

Международное непатентованное название: Эхинацеи пурпурной травы сок.

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав: каждый мл содержит:

Активное вещество:

Эхинацеи пурпурной травы сок высушенный (45:1) 46,5 мг.

Аскорбиновая кислота 20 мг,

Вспомогательные вещества: сорбат калия 2 мг, динатрия эдетат 0,5 мг, глицерин 50 мг, сорбитол 300 мг, натрия гидроксид 1,6 мг, вода очищенная q. s. до 1 мл.

Фармакотерапевтическая группа: Иммуностимулирующий препарат. Прочие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Иммуностимулирующий препарат растительного происхождения. Препарат оказывает иммуностимулирующее, противовоспалительное, противомикробное и противовирусное действие.

Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea*) содержит активные вещества, усиливающие естественные защитные силы организма и действующие в качестве неспецифических стимуляторов. Повышая число лейкоцитов (гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, действующие вещества препарата подавляют размножение микроорганизмов в организме человека и способствуют уничтожению болезнетворных бактерий. Кроме того, установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей гриппа и герпеса.

Аскорбиновая кислота (витамин С) является мощным антиоксидантом и защищает клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Аскорбиновая кислота усиливает иммунный ответ организма, способствуя повышению сывороточной концентрации интерферона и защитных антител.

Фармакокинетика:

Данные по фармакокинетике препарата Иммубелс не предоставлены.

Показания к применению:

Для укрепления иммунитета с целью:

- профилактики простудных заболеваний и гриппа;
- комплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения процесса выздоровления;
- в качестве источника витамина С, необходимого при острых респираторных заболеваниях;
- при антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

Препарат также полезен для людей, проживающих в экологически неблагоприятных районах (для выведения из организма солей тяжелых металлов).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к растениям семейства сложноцветных);
- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, СПИД или ВИЧ-инфекция);
- дети до 1 года.

С осторожностью применять препарат у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, детям до 12 лет.

Беременность и период лактации:

Данные о негативном воздействии препарата Иммубелс отсутствуют.

Перед применением препарата при беременности и в период лактации необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Применять внутрь независимо от приема пищи.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 2-3-мл 3 раза в день.

Дети в возрасте от 4 до 12 лет: по 1-2 мл, 3 раза в день.

Дети в возрасте от 1 года до 4 лет: по 1 мл 3 раза в день.

Для лечения прием препарата следует начинать при первых признаках простуды.

Для достижения терапевтического эффекта Иммубелс следует принимать в течение 7-10 дней. Повторные курсы возможны после 14-дневного перерыва.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдром Стивенса--Джонсона, анафилактический шок.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Иммубелс не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственного взаимодействия с другими препаратами не наблюдалось, тем не менее строго не рекомендуется одновременное применение препарата Иммубелс с препаратами иммуносупрессивного действия (циклоsporин и метотрексат).

Особые указания:

Перед применением препарата Иммубелс пациентам с аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой и у детей до 12 лет необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Перед употреблением тщательно взболтать флакон.

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь 50 мл в стеклянном флаконе янтарного цвета. Один флакон вместе с дозатором 5 мл и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:


Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

 **Belinda**
Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Сурья Хербал Лтд.
Индия

belinda.tj