

 PANTONE 179 C

 PANTONE 432 C

160x160mm

ЛИНДАВИТ ЦИРОН

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Линдавит Цирон.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь в стиках.

Состав: каждый стик с раствором содержит:

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) 50 мг

Железо (железа бисглицинат) 14 мг

Вспомогательные вещества: глицерин (E422), лимонная кислота (E330), ароматизатор вишня, ксантановая камедь (415), сорбат калия (202), сукралоза (E955), вода.

Фармакотерапевтическая группа: аскорбиновая кислота (витамин С) в комбинации с другими препаратами.

Код АТХ: A11GB.

Фармакологическое действие:

Линдавит Цирон - комбинированный антианемический препарат, содержащий железо в виде бисглицината железа и витамин С увеличивающий абсорбцию железа в организме.

Железо – минеральное вещество, способствует поддержанию нормального уровня эритроцитов и энергетического обмена, нормальному транспорту кислорода в организме, образованию гемоглобина, принимает участие в функции деления клеток, поддерживает стабильный энергетический метаболизм и оптимальное функционирование иммунной системы.

Железа бисглицинат органическая форма железа, которая за счет своего химического строения усваивается организмом лучше по сравнению с минеральными солями железа.

Витамин С - поддерживает нормальное функционирование иммунной системы в организме. Помогает защитить клетки от окислительного стресса, обладает антиоксидантными свойствами. Витамин С в сочетании с железом снижает усталость в организме и улучшает усвоение железа.

Показания к применению:

- лечение железодефицитной анемии у взрослых;
- профилактика дефицита железа в группах риска.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- анемии, не связанные с дефицитом железа;
- гемохроматоз, гемосидероз;
- талассемия;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- интоксикация свинцом.

Беременность и период лактации:

Прием препарата возможен только после консультации с врачом.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 стик 1 раз в день.

Врач может подобрать индивидуальную систему лечения.

Содержимое 1 стика растворить в 100 мл питьевой воды комнатной температуры.

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости можно повторить прием.

Для лучшего усвоения, препарат Линдавит Цирон следует принимать примерно за час до еды или через 2 часа после еды .

Побочные действия:

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: нечасто: изжога, диарея.

Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна: аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

При одновременном приеме препарата с другими лекарствами следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

В ходе лечения рекомендуется периодически определять уровень гемоглобина, ферритина, сывороточного железа в крови.

Не принимать препарат Линдавит Цирон одновременно с молоком и молочными продуктами, черным чаем, зеленым чаем или кофе. Эти продукты препятствуют усвоению железа в организме и снижают его эффект.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь 10 мл в стиках. 10 стиков вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

Срок годности:

24 месяца. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories LLP
Лондон, Великобритания
Производитель:
Fortex Nutraceuticals Ltd.,
Болгария