
 PANTONE 179 C
 PANTONE 432 C

front side
160 x 160 mm

ЛИНДАВИТ СЛИМ

Инструкция по применению

Торговое название: Линдавит Слим.

Международное непатентованное название:

Пиколинат хрома

Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Состав: 1 таблетка содержит:

Хром (пиколинат хрома) 200 мкг

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, лактоза, пшеничный крахмал, мальтодекстрин, тальк, стеарат магния, диоксид кремния, белое покрытие.

Фармакологическое действие:

Линдавит Слим – оказывает анорексигенное, нормализующее липидный и углеводный обмен, восполняющее дефицит хрома действие.

Пиколинат хрома – это тот же самый хром, только комбинированный с пиколиновой кислотой, которая улучшает всасывание элемента, усиливая его эффективность и пользу для организма. Комбинация хрома с пиколиновой кислотой повышает степень его усвоения до 90 процентов. Особенность пиколината хрома состоит в том, что он стимулирует активность инсулина, способствуя тем самым метаболизму глюкозы и жиров. Хром позволяет легче придерживаться низкоуглеводного питания за счет уменьшения тяги к сладкому, а также помогает ускорить обмен веществ.

Хром помогает увеличить расход калорий при физических нагрузках, что облегчает процесс похудения.

Показания к применению:

- в качестве дополнительного источника хрома;
- для уменьшения избыточного веса — при необходимых физических нагрузках;
- как средство, способствующее сокращению жировых отложений;
- для сохранения мышечного объема при низкокалорийном питании;
- для регуляции аппетита, уменьшения тяги к сладкому и мучному;
- для нормализации обмена веществ;
- для регуляции содержания глюкозы в крови.

Способ применения и дозы:

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Не превышать рекомендуемую

суточную дозу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Беременность и период лактации:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Побочные действия:

Возможно возникновение аллергических реакций.

Диспепсические расстройства, головокружение.

Передозировка:

При передозировке развиваются аллергические реакции: крапивница; кожный зуд; бронхоспазм; отек Квинке; дерматит. В случае передозировки пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска:

30 таблеток в блистере, по 2 блистера с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

24 месяца. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories LLP,
Лондон, Великобритания
Производитель:
FORTEX NUTRACEUTICALS Ltd.,
София, Болгария